

لمفا نجیو مایومٹوسس کی تشخیص اور ڈائگنوزنگ کے لئے ہدایات

ڈائگنوسس کے لیے ہمیشہ کم سے کم عمل جراحی استعمال کریں۔

ڈائگنوسس

- صرف سسٹک پھیپھڑوں کی بیماری کے سی ٹی نتائج ایل اے ایم کی تصدیق شدہ ڈائگنوسس کے لیے کافی نہیں ہیں۔
- وی ای جی ایف-ڈی ٹیسٹنگ تشخیص کے لیے مفید ہے اور پھیپھڑوں کی بائیپسی سے بچنے میں مدد کر سکتی ہے۔
- دیگر نتائج جو ایل اے ایم کی تصدیق شدہ ڈائگنوسس قائم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں ان میں شامل ہیں: بصلی سکلیروسیس کمپلیکس کی موجودگی ایس س، گردے کے انجیومیولیپومس، اور
- لیمفاٹک مظاہر جیسے چائلس ایفیوژن یا لمفا نجیو مایومٹوسس۔
- ایسے مریضوں میں جہاں غیر جراحی ذرائع تصدیق شدہ ڈائگنوسس فراہم کرنے میں ناکام رہے ہیں،
- سرجیکل پھیپھڑوں کی بائیپسی سے پہلے ٹرانس برونکٹل پھیپھڑوں کی بائیپسی پر غور کریں۔



علاج

- سیرولیمسائل اے ایم مریضوں کے لیے علاج کا پہلا آپشن ہے جو:
 1. غیر طبعی یا تیزی سے پھیپھڑوں کے کام میں کمی
 2. اہم بیماریوں کا بوجھ
 3. دشوار چائلس ایفیوژن
- ایل اے ایم کے معمول علاج کے لیے ٹوسی سانکلنیا ہارمونل تھیراپی کا استعمال نہ کریں۔
- بار بار ہونے والے واقعے کا انتظار کرنے کے بجائے خود بخود نیوموتھوریکس کی ابتدائی قسط کے بعد پلو روڈیسس کی پیشکش کریں۔
- اس سے پہلے پلو روڈیسس پھیپھڑوں کے ٹرانسپلانٹیشن کے لیے غیر موافق علامت نہیں ہے۔

سی کورمیک ایف ایکس، گپتا این، فنلے جی اے، وغیرہ۔ ایم جے ریسپائر کرٹ کیئر میڈ۔ 761-748:(6)194۔ گپتا این، فنلے جی اے، کوٹلوف آر ایم، ایٹ ال۔ ایم جے ریسپائر کرٹ کیئر میڈ۔ 1337(10)196-1348

ایل اے ایم طبی ہدایات خطوط کے بارے میں مزید معلومات کرنے کے لیے، اپنے فون کے کیمرہ کو کیو آر کوڈ کی طرف دائیں طرف کریں، یا ملاحظہ کریں: thelamfoundation.org/LAM-Treatment-Guidelines



اس پروجیکٹ کو سینے فاؤنڈیشن کے گرانٹس سے فنڈ کیا گیا تھا اور یہ ایل اے ایم فاؤنڈیشن کے تعاون سے کیا جا رہا ہے۔